

Bronchostop® Sine Hustensaft

8,6 mg/ml Thymiankraut-Trockenextrakt, 55,3 mg/ml Eibischwurzel-Auszug

Zusammensetzung:

Wirkstoffe:

1 ml enthalten:

8,6 mg Trockenextrakt aus Thymiankraut (7 - 13 : 1), Auszugsmittel: Wasser

55,3 mg Auszug aus Eibischwurzeln (1 : 12 - 14), Auszugsmittel: Wasser

Sonstige Bestandteile:

Xylitol (E 967), Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) (E 218)), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216)(Ph.Eur.), Himbeersaftkonzentrat (enthält Saccharose (Zucker), Glucose und Fructose), Himbeer-Aroma (enthält Propylenglycol (E 1520), Xanthangummi, Citronensäure-Monohydrat, Maltodextrin, arabisches Gummi, gereinigtes Wasser

Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Xylitol (E 967), Himbeersaftkonzentrat (enthält Saccharose, Glucose und Fructose) und Propylenglycol (E 1520).

Packungsbeilage beachten.

Anwendungsgebiete:

Bronchostop® Sine Hustensaft ist ein traditionelles pflanzliches Arzneimittel angewendet zur Linderung von Schleimhautreizungen im Mund- und Rachenraum und damit verbundenem trockenem Reizhusten sowie zur Förderung des Abhustens bei produktivem Husten im Zusammenhang mit einer Erkältung. Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Gegenanzeigen:

Bronchostop® Sine Hustensaft darf nicht eingenommen werden bei Allergie gegen Thymiantrockenextrakt, Eibischwurzelflüssigextrakt, ein anderes Mitglied aus der Familie der Lippenblütler oder einen sonstigen Bestandteil dieses Arzneimittels.

Nebenwirkungen:

Die Häufigkeit des Auftretens der folgenden Nebenwirkungen ist nicht bekannt: Dieses Arzneimittel kann die folgenden schweren allergischen Reaktionen hervorrufen. Wenn Sie eine der folgenden Wirkungen bemerken, brechen Sie die Einnahme des Arzneimittels ab und suchen Sie dringend

einen Arzt auf: Symptome wie Schwindelgefühl oder Ohnmacht, Atembeschwerden oder Keuchen, schneller Herzschlag, Hautausschlag, Verwirrung und Angstzustände oder Bewusstlosigkeit (anaphylaktische Reaktion), Anschwellen von Gesicht, Lippen, Zunge, Mund oder Rachen (Angioödem), Blasenbildung im Mund- und Rachenraum, Verschlimmerung von Asthmasymptomen, Atembeschwerden (einschließlich Kurzatmigkeit)
Andere mögliche Nebenwirkungen

Wenn eine der folgenden Nebenwirkungen schwerwiegend ist oder Sie beunruhigt, oder wenn Sie eine andere Nebenwirkung bemerken, brechen Sie die Einnahme des Arzneimittels ab und suchen Sie so bald wie möglich einen Arzt auf: Allergische Hautreaktionen einschließlich Urtikaria (rote Beulen auf der Haut) und Juckreiz, Magen-Darm-Beschwerden wie Schmerzen oder Unwohlsein im Bauchraum, Durchfall, Erbrechen und Übelkeit.

Warnhinweis:

Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat (E 218), Propyl-4-hydroxybenzoat (E 216), Xylitol (E 967), Himbeersaftkonzentrat (enthält Saccharose, Glucose und Fructose) und Propylenglycol (E 1520).

Packungsbeilage beachten.

Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, 1160 Wien, Österreich; Cassella-med, Gereonsmühlengasse 1, 50670 Köln, Deutschland.

Stand: Jan-2025