PFLICHTANGABEN

Quimbo® Sirup/ Tropfen

Wirkst.: Levodropropizin.

Zus.: 10 ml Sirup/ Lösung enth. 60/ 600 mg Levodropropizin. Sirup: 400 mg/ml Saccharose, 1,3 mg/ml Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.), 0,2 mg/ml Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.). Tropfen: Enth. 200 mg Propylenglycol pro Dosis von 20 Tropfen.

Sonst. Bestandt.: Sirup: Saccharose, Citronensäure-Monohydrat, Natriumhydroxid, Kirscharoma, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) 13 mg, Propyl-4-hydroxybenzoat (Ph. Eur.) 2 mg, ger. Wasser; Tropfen: Propylenglycol, Xylitol, Saccharin Natrium, Methyl-4-hydroxybenzoat (Ph.Eur.) 15 mg, Aromastoffe, Citronensäure, ger. Wasser.

Anw.: Symptomat. Therapie des Reizhustens (unprodukt. Husten) b. Erw., Jugendl. u. Kdrn. ab 2 Jahren.

Gegenanz.: Überempfindlichk. gg. den Wirkst. od. einen der sonst. Bestandt., erhöhte Bronchialsekretion, vermind. mukoziliärer Funktion (Kartagener-Syndrom, Ziliendyskinesie), schwere Leberfunktionsstörung, Stillende, Kdr. unter 2 Jahren.

Warnhinw.: Quimbo Sirup/Tropfen enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis von 10 ml (Sirup)/20 Tropfen, d.h. es ist nahezu „natriumfrei“. Enth. Methyl-4-hydroxybenzoat, welches Überempfindlichkeitsreakt., auch Spätreakt., hervorrufen kann. Sirup: 10 ml Sirup enth. 4,0 g Saccharose, entspr. ca. 0,3 BE. Dies ist bei Pat. mit Diabetes mellitus zu berücksichtigen. Pat. mit der seltenen hereditären Fructose-Intoleranz, Glucose-Galactose-Malabsorption od. Saccharase-Isomaltase-Mangel sollten Quimbo Sirup nicht einnehmen. Enth. Propyl-4-hydroxybenzoat, welches Überempfindlichkeitsreakt, auch Spätreakt., hervorrufen kann. Tropfen: Enth. Propylenglycol.

Nebenwirk.: Überempfindlichkeits- u. allerg. Reakt.; Nervosität, Persönlichkeitsänderungen; Kopfschmerzen, Präsynkope, Synkope, Schwindel, Tremor, Parästhesien, generalisierte tonisch-klonische Anfälle, Petit-mal-Epilepsie, Somnolenz, Bewusstlosigk.; Mydriasis, Sehstörungen, Augenlidödem; Vertigo; Palpitationen, Tachykardie; Hypotonie; Dyspnoe, Husten, Atemwegsödeme; Magenschmerzen, Bauchschmerzen, Dyspepsie, Übelk., Erbrechen, Diarrhoe, Aphthen, Glossitis; cholestatische Hepatitis; Urtikaria, Erytheme, Hautausschläge, Pruritus, Angioödem, Hautreakt.; Muskelschwäche; Unwohlsein, generalisierte Ödeme, Asthenie, Müdigk., Brustschmerzen.

Apothekenpflichtig. Stand: 07/2026. Pädia GmbH,
Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim