

Mirfulan® 10 g/100 g Salbe **Mirfulan® Spray N, Salbe**

Wirkstoffe: Mirfulan: 10 g Zinkoxid. Mirfulan Spray N: 13 g Zinkoxid, 0,026 g (+/-)-alpha-Bisabolol, 5,2 g Lebertran, 24,5 mg Retinol (Vitamin A), 10,4 mg Colecalciferol (Vitamin D3). **Zusammensetzung:** Mirfulan: 100 g Salbe enth.: 10 g Zinkoxid. Sonst. Bestandt.: Harnstoff; Lebertran (standard. auf 10000 I.E. Vit. A u. 2000 I.E. Vit. D3 pro g Lebertran); Hamamelisrinde, Destillat mit Ethanol/Ethanol-Wasser (%-Angaben); weißes Vaseline, Wollwachsalkoholsalbe; dünnflüssiges Paraffin; Glycerolmonostearat 40-55; 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-L-(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure-Citronensäure-1H₂O-Glycerolmonostearat Propylenglycol (10:5:2.5:5:27.5) (G/G); gerein. Wasser. Mirfulan Spray N: 125 ml (entsp. 99 g) Salbenspray enth.: 13 g Zinkoxid, 0,026 g (+/-)-alpha-Bisabolol eingesetzt als Dragosantol-Zubereitung, 5,2 g Lebertran (Typ A), 24,5 mg Retinol (Vitamin A entspr. 41600 I.E. Retinolpalmitat; enth. Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol), 10,4 mg Colecalciferol (Vitamin D3 entspr. 10400 I.E. in Mittelkett. Triglyceriden; enth. all-rac-alpha-Tocopherol). Sonst. Bestandt.: 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol-L-(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure-Citronensäure-1H₂O-Glycerolmonostearat-Propylenglycol (10:5:2.5:5:27.5) (G/G), Wollwachsalkoholsalbe (enth. u.a. Cetylstearylalk.), Weißes Vaseline, Düninflüss. Paraffin, Parfümölm. Dermasafe Dolcenta. Treibgas: Butan, Propan-/2-Methylpropan-Gemisch.

Anwendungsgebiete:

Mirfulan: Abdeck.-protektive u. sekretbind. Behandl. v. nichtinfiz. akuten u. subakuten Hautschäden, mit Rötung, Juckreiz u. Schmerzen (z.B. Windeldermatitis). Zinkoxid: abdeckend-protektiv u. sekretbindend. Hinweis: Sollte sich im betroffenen Hautbereich keine Besserung einstellen, oder sollten die Beschwerden fortbestehen, ist ein Arzt aufzusuchen. Mirfulan Spray N: Traditionell angew. als mild wirkendes Arzneimittel zur Unterstütz. d. Wundheilung. Zur Anwendung bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Gegenanzeigen: Allergie geg. den Wirkstoff, Wollwachsalkohole od. and. sonstigen Bestandteile. Infizierte Wunde. **Warnhinweis:** Mirfulan: Enthält Ethanol, Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol, Cetylstearylalkohol und Wollwachs. Mirfulan Spray N: Enthält Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol, Cetylstearylalkohol und Wollwachs. Packungsbeilage beachten.

Nebenwirkungen: Mirfulan: Gelegentlich: Lokale Unverträglichk./Überempfindlichk.reak. wie Juckreiz, Nässen, Rötung, Austrockn., allerg. Kontaktreaktionen. Sehr selten: Mögl. leichtes Brennen nach Auftragen auf stark entzündl. Hautpartien. Mirfulan Spray N: Häufigkeit des Auftretens ist nicht bekannt: Reizersch, allerg. Reakt sowie Kontaktallerg. mit z. B. Juckreiz, Nässen u. Rötung. Aufsprühen auf frische Wunden: vorübergeh. Brennen durch Treibmittel (Propan/Butan). **Apothekenpflichtig. Stand:** Mirfulan: August 2020, Mirfulan Spray N: Juni 2020 **Zulassungsinhaber:** Recordati Pharma GmbH, Eberhard-Finckh-Str. 55, 89075 Ulm.